

乳幼児期に受ける予防接種一覧

令和6年4月改訂

予防接種の種類	接種回数		間隔	標準的接種期間	対象者
ロタウイルス	ロタリックス	2回	27日以上の間隔をにおいて2回	初回は、生後2か月～ 出生14週6日まで	出生6週0日 ～24週0日
	ロタテック	3回	27日以上の間隔をにおいて3回		出生6週0日 ～32週0日
B型肝炎	1回目			生後2か月	生後12か月未満
	2回目		27日以上の間隔で2回目	生後3か月	
	3回目		1回目接種から139日以上経過した後3回目	生後7～8か月	
ヒブ ※接種開始時期により 接種回数が異なります	生後 2～7か月 未満に開始	初回3回 追加1回	初回：27日（医師が認める場合 は20日以上）～56日	初回接種開始は 生後2～7か月未満	生後2～60か月未満
	生後 7～12か月 未満に開始	初回2回 追加1回	※1歳を超えた場合、初回接種 は行わない	追加接種は初回終了後 7か月以上13か月の 間隔をおく	
	生後 12～60か月 未満に開始	1回	追加：初回接種後7か月以上		
小児用 肺炎球菌 (13価・15価) ※接種開始時期により 接種回数が異なります	生後 2～7か月 未満に開始	初回3回 追加1回	初回：27日以上 ※2歳を超えた場合、初回接種 は行わない。	初回接種開始は 生後2～7か月未満 追加接種は 生後12～15か月未満	生後2～60か月未満
	生後 7～12か月 未満に開始	初回2回 追加1回	追加：初回終了後60日以上 かつ生後12か月以降		
	生後 12～24か月 未満に開始	2回	60日以上		
	生後 24～60か月 未満に開始	1回			
* 4種混合 DPT-IPV（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ）／5種混合 DPT-IPV-Hib（4種混合＋ヒブ）					
4種混合	1期初回	3回	20日以上（20～56日）	生後2～12か月未満	生後2～90か月未満
	1期追加	1回	1期初回（3回目）終了後 6か月以上	1期初回終了後 12～18か月の間隔をおく	
5種混合	1期初回	3回	20日以上（20～56日）	生後2～7か月未満	生後2～90か月未満
	1期追加	1回	1期初回（3回目）終了後 6か月以上	1期初回終了後 6～18か月の間隔をおく	
BCG	1回			生後5～8か月	生後12か月未満
水痘	1回目			生後12～15か月未満	生後12～36か月未満
	2回目		1回目接種後3か月以上	1回目接種後6～12か月	
麻しん、風しん 混合（MR）	1期	1回	【対象年齢】 生後12～24か月未満		
	2期	1回	【対象年齢】 小学校入学前1年間に相当する方 （平成30年4月2日～平成31年4月1日までの間に生まれた方） 【接種期間】 令和6年4月1日～令和7年3月31日		
日本脳炎	1期初回	2回	6日以上（6～28日）	3歳	生後6～90か月未満
	1期追加	1回	1期初回（2回目）終了後 6か月以上	4歳（1期初回終了後 おおむね1年おく）	

予防接種の種類	助成対象者	備考
おたふくかぜ	1～3歳未満	1人1回のみ（2,000円）費用助成



【問い合わせ先】 桑名市役所2階 子ども総合センター 母子保健係
TEL 0594-24-1380 FAX 0594-24-5497